

非小細胞肺癌に対する【80kg未満】CBDCA+Pemetrexed+Amivantamab療法 1コース目 (day8,15)

(カルボプラチン+ペメトレキセド+ライブリバント) <<ORIP>>RPHW_1

2025年01月20日 承認

Dr.signNs.signPh.sign

病棟・科名	登録番号	氏名	年齢	身長	体重	体表面積
	<<SYPID>>	<<ORIBP_KANJI>>様	<<SYAGE>>	cm	kg	m ²
疾患名	施行予定日	実施サイクル	【調製指示】			
	月 日 ~ ()	コース目	☐ TEL連絡後調製			
備考[標準投与量逸脱など]			放射線併用			
			☐ 有 ☐ 無			


Day8(/)

Day15((/)

《ライブリバント投与60分前に服用》

カロナール錠(500) 2T

ライブリバントの
過敏反応防止のため



【ペメトレキセドの投与終了(中止)時の注意事項】

- (1) パンビタン末は、最終投与日から22日目まで可能な限り投与する。
- (2) シアノバリン注は、投与期間中および投与中止後22日目まで9週ごと(3コースごと)に1回投与する。

CBDCA+PEM+Amivantamab療法

標準投与量

CBDCA	AUC=5	day1
PEM	500 mg/m ²	day1
Amivan	350 mg/body	day1
	1050 mg/body	day2
	1400 mg/body	day8,15
		3週毎