

非小細胞肺癌に対する【80kg未満】CBDCA+Pemetrexed+Amivantamab療法 2コース目

(カルボプラチン+ペトレキセド+ライブリバント) <<ORIP>>RPHW\

2025年01月20日 承認

Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号	氏名	年齢	身長	体重	体表面積
	<<SYPID>>	<<ORIBP_KANJI>>	様 <<SYAGE>>	cm	kg	m ²
疾患名	施行予定日	実施サイクル	【調製指示】			
	月 日 ~ ()	コース目	コース予定 □ TEL連絡後調製			
備考[標準投与量逸脱など]			放射線併用 □ 有 □ 無			

Day1 (/)

Day2 (/) ~ Day3 (/)

アプレピタントカプセル125mg 1回 1Cを
治療開始前に服用

《カルボプラチン投与前に服用》
カロナール錠(500) 2T ライブリバントの
過敏反応防止のため

生理食塩水 500mL 本管

(4hr) 全開で 生理食塩水 50mL 側管

(30min) パロノセトロン 0.75mg/50mL
ポラミン5mg 1A
デキサート6.6mg 1V
デキサート3.3mg 1A
(リン酸エステル換算 12mg)

(10min) ペトレキセド mg 全量 ml

(1hr) 生理食塩水 250mL
カルボプラチン mg

全開で 生理食塩水 50mL

専用ルート (2hr) 生理食塩水 222mL
ライブリバント 1400 mg 全量 250 ml

全開で 生理食塩水 50mL

終了抜去

アプレピタントカプセル80mg 1回 1Cを
午前中(朝食後)に服用

デカドロン錠 1回 8錠を
1日2回(朝昼食後) 服用

【ペトレキセドの投与終了(中止)時の注意事項】

(1) パンビタン末は、最終投与日から
22日目まで可能な限り投与する。

(2) シアノバタミ注は、投与期間中および
投与中止後22日目まで
9週ごと(3コースごと)に1回投与する。

使用Cre値

mg/dl

補正あり

補正なし

GFR算出式

□ Cockcroft-Gault

□ Jelliffe

□ 24hrCcr

CBDCA+PEM+Amivantamab療法

標準投与量

CBDCA AUC=5 day1

PEM 500 mg/m² day1

Amivan 1400 mg/body day1

3週毎