

非小細胞肺癌に対する【80kg未満】CBDCA+Pemetrexed+Amivantamab療法 2コース目

(カルボプラチン+ペトレキセド+ライブリバント) <<ORIP>>RPHWJ

2025年01月20日 承認

Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号	氏名	年齢	身長	体重	体表面積
	<<SYPID>>	<<ORIBP_KANJI>>	様 <<SYAGE>>	cm	kg	m ²
疾患名	施行予定日	実施サイクル	【調製指示】			
	月 日 ~ ()	コース目	□ TEL連絡後調製			
備考[標準投与量逸脱など]			放射線併用			
			□ 有 □ 無			

Day1 (/)

アプレピタントカプセル125mg 1回 1Cを
治療開始前に服用

《カルボプラチン投与前に服用》

カロナール錠(500) 2T ライブリバントの
過敏反応防止のため

生理食塩水 500mL

本管

(4hr)

全開で

生理食塩水 50mL

側管

パロノセトロン 0.75mg/50mL

ポララミン5mg 1A

デキサート6.6mg 1V

デキサート3.3mg 1A

(リン酸エステル換算 12mg)

(30min)

全量

(10min)

ペトレキセド mg

ml

(1hr)

生理食塩水 250mL

カルボプラチン mg

全開で

生理食塩水 50mL

専用ルート

(2hr)

生理食塩水 222mL

ライブリバント 1400 mg

全開で

生理食塩水 50mL

全量

250 ml

終了抜去

Day2 (/) ~ Day3 (/)

アプレピタントカプセル80mg 1回 1Cを
午前中(朝食後)に服用デカドロン錠 1回 8錠を
1日2回(朝昼食後) 服用

【ペトレキセドの投与終了(中止)時の注意事項】

- (1) パンビタン末は、最終投与日から22日目まで可能な限り投与する。
- (2) シアノバタミン注は、投与期間中および投与中止後22日目まで9週ごと(3コースごと)に1回投与する。

使用Cre値

mg/dl

□ 補正あり

□ 補正なし

GFR算出式

□ Cockcroft-Gault

□ Jelliffe

□ 24hrCcr

□

CBDCA+PEM+Amivantamab療法

標準投与量

CBDCA AUC=5 day1

PEM 500 mg/m² day1

Amivan 1400 mg/body day1

3週毎