

非小細胞肺癌に対する【80kg以上】CBDCA+Pemetrexed+Amivantamab療法 2コース目

(カルボプラチン+ペトレキセド+ライブリバント) <<ORIP>>RPHW\

2025年01月20日 承認

Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号	氏名	年齢	身長	体重	体表面積
	<<SYPID>>	<<ORIBP_KANJI>>	様 <<SYAGE>>	cm	kg	m ²
疾患名	施行予定日	実施サイクル	【調製指示】			
	月 日 ~ ()コース目	コース予定	☐ TEL連絡後調製			
備考[標準投与量逸脱など]			放射線併用			
			☐ 有 ☐ 無			

Day1 (/)

アプレピタントカプセル125mg 1回 1Cを
治療開始前に服用

《カルボプラチン投与前に服用》

カロナール錠(500) 2T ライブリバントの
過敏反応防止のため

生理食塩水 500mL

本管

(4hr)

全開で

生理食塩水 50mL

側管

(30min)

パロノセトロン 0.75mg/50mL
ポララミン5mg 1A
デキサート6.6mg 1V
デキサート3.3mg 1A
(リン酸エステル換算 12mg)

(10min)

ペトレキセド mg

全量

ml

(1hr)

生理食塩水 250mL
カルボプラチン mg

全開で

生理食塩水 50mL

専用ルート
(2hr)生理食塩水 215mL
ライブリバント 1750 mg

全開で

生理食塩水 50mL

全量

250 ml

終了抜去

Day2 (/) ~ Day3 (/)

アプレピタントカプセル80mg 1回 1Cを
午前中(朝食後)に服用デカドロン錠 1回 8錠を
1日2回(朝昼食後) 服用

【ペトレキセドの投与終了(中止)時の注意事項】

- パンビタン末は、最終投与日から22日目まで可能な限り投与する。
- シアノバラミン注は、投与期間中および投与中止後22日目まで9週ごと(3コースごと)に1回投与する。

GFR算出式

使用Cre値

mg/dl

☐ 補正あり☐ 補正なし☐ Cockcroft-Gault☐ Jelliffe☐ 24hrCcr☐

CBDCA+PEM+Amivantamab療法

標準投与量

CBDCA	AUC=5	day1
PEM	500 mg/m ²	day1
Amivan	1750 mg/body	day1
3週毎		