

非小細胞肺癌に対する【80kg以上】CBDCA+Pemetrexed+Amivantamab療法3-4コース目

(カルボプラチン+ペメトレキセド+ライブリバント) <<ORIP>>RPHWJ


2025年01月20日 承認		Dr.sign	Ns.sign	Ph.sign		
病棟・科名	登録番号	氏名	年齢	身長	体重	体表面積
	<<SYPID>>	<<ORIBP_KANJI>>	様 <<SYAGE>>	cm	kg	m ²
疾患名	施行予定日	実施サイクル	【調製指示】			
	月 日 ~ ()	コース目	☐ TEL連絡後調製			
備考[標準投与量逸脱など]			放射線併用			
			☐ 有 ☐ 無			

Day1 (/)

アプレピタントカプセル125mg 1回 1Cを
治療開始前に服用

《カルボプラチン投与前に服用》

カロナール錠(500) 2T ライブリバントの
過敏反応防止のため



Day2 (/) ~ Day3 (/)

アプレピタントカプセル80mg 1回 1Cを
午前中(朝食後)に服用

デカドロン錠 1回 8錠を
1日2回(朝昼食後) 服用

- 【ペメトレキセドの投与終了(中止)時の注意事項】
- (1) パンピタン末は、最終投与日から22日目まで可能な限り投与する。
- (2) シアノバタリン注は、投与期間中および投与中止後22日目まで9週ごと(3コースごと)に1回投与する。

使用Cre値	GFR算出式	
	☐ Cockcroft-Gault	
	☐ Jelliffe	
	☐ 24hrCcr	
mg/dl	☐ 補正あり	
☐ 補正なし		

CBDCA+PEM+Amivantamab療法

標準投与量			
CBDCA	AUC=5	day1	
PEM	500 mg/m ²	day1	
Amivan	2100 mg/body	day1	
3週毎			