

非小細胞肺癌に対する【80kg未満】 Pemetrexed+Amivantamab療法5コース目以降

(ペトレキシド+ライブリバント)

DRPHW_DRPHW_1

2025年01月20日 承認		Dr.sign		Ns.sign		Ph.sign	
病棟・科名	登録番号	氏名	年齢	身長	体重	体表面積	
	<<SYPID>>	<<ORIBP_KANJI>>	様 <<SYAGE>>	cm	kg	m ²	
疾患名	施行予定日		実施サイクル		【調製指示】		
	月 日 ~ ()コース目		コース予定		☐ TEL連絡後調製		
備考[標準投与量逸脱など]					放射線併用		
					☐ 有 ☐ 無		


Day1 (/)

Day2 (/) ~ Day3 (/)

《ライブリバント投与60分前に服用》

カロナール錠(500) 2T ライブリバントの過敏反応防止のため

デカドロン錠 1回 8錠を
1日2回(朝昼食後) 服用



【ペトレキシドの投与終了(中止)時の注意事項】

(1) パンビタン末は、最終投与日から22日目まで可能な限り投与する。

(2) シアノコバラミン注は、投与期間中および投与中止後22日目まで9週ごと(3コースごと)に1回投与する。

Pemetrexed+Amivantamab療法

標準投与量:

Pemetrexed 500 mg/m² day1

Amivantamab 1750 mg/body day1

3週毎