

非小細胞肺癌に対する【80kg未満】 Pemetrexed+Amivantamab療法5コース目以降

(ペムトレキセド+ライブリバント)

RPHW_RPHW_1

2025年01月20日 承認

Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号 <<SYPID>>	氏名 <<ORIBP_KANJI>>	年齢 様 <<SYAGE>>	身長 cm	体重 kg	体表面積 m ²
疾患名	施行予定日 月 日 ~ ()	コース目	実施サイクル コース予定	【調製指示】 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		
備考[標準投与量逸脱など]				放射線併用 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		

Day1 (/)

《ライブリバント投与60分前に服用》

カロナール錠(500) 2T ライブリバントの過敏反応防止のため

本管

生理食塩水 500mL

(3hr)

側管

全開で

生理食塩水 50mL

(30min)

生理食塩水 50mL
ポララミン5mg 1A
デキサート6.6mg 1V
(リン酸エステル換算 8mg)

(10min)

ペムトレキセド mg

全量

ml

全開で

生理食塩水 50mL

専用ルート

(2hr)

生理食塩水 215mL
ライブリバント 1750 mg

全量

250

ml

全開で

生理食塩水 50mL

終了抜去

Day2 (/) ~ Day3 (/)

デカドロン錠 1回 8錠を
1日2回(朝昼食後) 服用

【ペムトレキセドの投与終了(中止)時の注意事項】

- パンビタン末は、最終投与日から22日目まで可能な限り投与する。
- シアノコバラミン注は、投与期間中および投与中止後22日目まで9週ごと(3コースごと)に1回投与する。

Pemetrexed+Amivantamab療法

標準投与量:

Pemetrexed 500 mg/m² day1
Amivantamab 1750 mg/body day1
3週毎