

非小細胞肺癌に対する【80kg以上】Pemetrexed+Amivantamab療法5コース目以降

(ペトレキセド+ライブリバント)

)RPHW_D RPHW_I

2025年01月20日 承認

Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号	氏名	年齢	身長	体重	体表面積
	<<SYPID>>	<<ORIBP_KANJI>>	様 <<SYAGE>>	cm	kg	m ²
疾患名	施行予定日	実施サイクル	【調製指示】			
	月 日 ~ ()コース目	コース予定	☐ TEL連絡後調製			
備考[標準投与量逸脱など]			放射線併用			
			☐ 有 ☐ 無			

Day1 (/)

《ライブリバント投与60分前に服用》

カロナール錠(500) 2T ライブリバントの
過敏反応防止のため

本管

生理食塩水 500mL

(3hr)

側管

生理食塩水 50mL

全開で

生理食塩水 50mL
ボララミン5mg 1A
デキサート6.6mg 1V
(リン酸エステル換算 8mg)

(30min)

全量

ml

ペトレキセド mg

(10min)

生理食塩水 50mL

全開で

専用ルート

生理食塩水 208mL
ライブリバント 2100 mg

(2hr)

全量

250 ml

生理食塩水 50mL

全開で

終了抜去

Day2 (/) ~ Day3 (/)

デカドロン錠 1回 8錠を
1日2回(朝昼食後) 服用

【ペトレキセドの投与終了(中止)時の注意事項】

- パンビタン末は、最終投与日から22日目まで可能な限り投与する。
- シアノコバラミン注は、投与期間中および投与中止後22日目まで9週ごと(3コースごと)に1回投与する。

Pemetrexed+Amivantamab療法

標準投与量:

Pemetrexed	500	mg/m ²	day1
Amivantamab	2100	mg/body	day1
3週毎			