

非小細胞肺癌に対する【80kg以上】 Pemetrexed+Amivantamab療法5コース目以降

(ペムトレキセド+ライブリバント)

DRPHW_DRPHW_1

2025年01月20日 承認

Dr.signNs.signPh.sign

病棟・科名	登録番号	氏名	年齢	身長	体重	体表面積
	<<SYPID>>	<<ORIBP_KANJI>>	様<<SYAGE>>	cm	kg	m ²
疾患名	施行予定日	実施サイクル	【調製指示】			
	月 日 ~ ()コース目	コース予定	☐ TEL連絡後調製			
備考[標準投与量逸脱など]			放射線併用			
			☐ 有 ☐ 無			


Day1(/)

Day2(/) ~ Day3(/)

《ライブリバント投与60分前に服用》

カロナール錠(500) 2T ライブリバントの過敏反応防止のため

デカドロン錠 1回 8錠を
1日2回(朝昼食後) 服用



【ペムトレキセドの投与終了(中止)時の注意事項】

(1) パンビタン末は、最終投与日から22日目まで可能な限り投与する。

(2) シアノコバラミン注は、投与期間中および投与中止後22日目まで9週ごと(3コースごと)に1回投与する。

Pemetrexed+Amivantamab療法				
標準投与量:				
Pemetrexed	500	mg/m ²	day1	
Amivantamab	2100	mg/body	day1	
				3週毎