

中枢神経系原発悪性リンパ腫に対する MPV療法【寛解導入】(1,3,5,7コース)

(メトレキサート、ロイコボリン、プロカルバジン)

DRPHW_DRPHW

2025年02月17日 承認

Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign


病棟・科名	登録番号	氏名	年齢	身長	体重	体表面積
	<<SYPID>>	<<ORIBP_KANJI>>	様 <<SYAGE>>	cm	kg	m ²
疾患名	施行予定日		実施サイクル		【調製指示】	
	月	日 ~ ()	コース目	コース予定	<input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製	
備考[標準投与量逸脱など]						

Day1 (/) ~ Day7 (/)


内服薬

プロカルバジン
★1日 mg
7日間 服用

Day1 (/)



Day2 (/) ~ Day5 (/)



※ 注意！！

- ・MTX血中濃度測定を経時的に行う。(投与開始後 24,48,72時間値)
- ・血中濃度が48h>1μM、72h>0.1μMのとき、ロイコボリンを51mg(6hr毎)に増量。血中濃度が<0.1μMになるまで続ける。
- ・尿量を3,000mL以上、尿pH7.0以上に保つ。
- ・フロセミドやNSAIDsは併用しないこと。
- ・ダイフェンは72時間以上前から休薬する。(ロイコボリン投与終了後より再開可能)

MPV療法(1,3,5,7コース目)

標準投与量:

メトレキサート	3500 mg/m ²	day1
オンコビン	1.4 mg/m ²	day1
プロカルバジン	100 mg/m ²	day1-7
ロイコボリン	24 mg/body	6時間毎
		2週毎