


中枢神経系原発悪性リンパ腫に対する MPV療法【寛解導入】(2,4,6コース)

(メトレキサート、ビンクリスチン)

DRPHW_DRPHW_1

2025年02月17日 承認

Dr.sign		Ns.sign		Ph.sign		
病棟・科名	登録番号	氏名	年齢	身長	体重	体表面積
	<<SYPID>>	<<ORIBP_KANJI>> 様	<<SYAGE>>	cm	kg	m ²
疾患名	施行予定日		実施サイクル	【調製指示】		
	月	日 ~ ()	コース目	□ 調製可 □ TEL連絡後調製		
備考[標準投与量逸脱など]				コース予定		



※ 注意！！

- ・MTX血中濃度測定を経時的に行う。(投与開始後 24,48,72時間値)
- ・血中濃度が48h>1μM、72h>0.1μMのとき、ロイコボリンを51mg(6hr毎)に増量。血中濃度が<0.1μMになるまで続ける。
- ・尿量を3,000mL以上、尿pH7.0以上に保つ。
- ・フロセミドやNSAIDsは併用しないこと。
- ・ダイフェンは72時間以上前から休薬する。(ロイコボリン投与終了後より再開可能)

MPV療法(2,4,6コース目)

標準投与量:			
メトレキサート	3500	mg/m ²	day1
オンコビン	1.4	mg/m ²	day1
ロイコボリン	24	mg/body	6時間毎
メトレキサート	12	mg/body	day11
デキサート	3.3	mg/body	day11
2週毎			