

非小細胞肺癌に対する CDDP+Pemetrexed+Pembrolizumab療法

(シスプラチン+ペトレキセド+キイトルーダ)

)RPHW_DRPHW_V

2025年01月20日 承認

Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号	氏名	年齢	身長	体重	体表面積
	<<SYPID>>	<<ORIBP_KANJI>>	様 <<SYAGE>>	cm	kg	m ²
疾患名	施行予定日	実施サイクル	【調製指示(初日)】			
	月 日 ~ ()コース目	コース予定	☐ TEL連絡後調製			
備考[標準投与量逸脱など]			放射線併用 ☐ 有 ☐ 無			

【必須項目】

- ☐ 投与7日以上前からパンビタン末1g 1×服用開始
☐ 初回投与の少なくとも7日前にシアノコバラミン注 1A筋注

Day1 (/ /)

本管

生理食塩水 500mL

(5hr)

側管

生理食塩水 50mL

全開で

一旦主管止め

専用ルート

生理食塩水 100mL
キイトルーダ mg

(30min)

※主管止めて単ルートで投与すること！

本管再開

全開で

生理食塩水 50mL

開始時

パロノセトロン 0.75mg/50mL
アロカリス 1V
デキサート6.6mg 1A
デキサート3.3mg 1A
(リン酸エステル換算 12mg)

(30min)

(10min)

ペトレキセド mg

全開で

生理食塩水 50mL

(1.5hr)

マンニトール 300mL

遮光

生理食塩水 300mL
シスプラチン mg

(2hr)

全開で

生理食塩水 50mL

ソルデム3A 500mL

(1.5hr)

ビカネイト 1000mL

(3hr)

終了後 ヘパロック

Day2 (/ /) ~ Day3 (/ /)

本管

ビカネイト 1000mL

(3hr)

側管

生理食塩水 100mL
デキサート3.3mg 1A
(リン酸エステル換算 4mg)

(30min)

ソルデム3A 500mL

(1.5hr)

マンニトール 300mL

(1.5hr)

Day2は終了後ヘパロック

【ペトレキセドの投与終了(中止)時の注意事項】

- (1) パンビタン末は、最終投与日から22日目まで可能な限り投与する。
(2) フレスミンS注は、投与期間中および投与中止後22日目まで9週ごと(3コースごと)に1回投与する。

CDDP+Pemetrexed+Pembro療法

標準投与量:

CDDP	75 mg/m ²	day1
Pemetrexed	500 mg/m ²	day1
Pembro	200 mg/body	day1
3週毎		