

大腸癌に対する CAPIRI+Bevacizumab療法

(イリノテカン+カペシタビン+ベバシズマブ)

DRPHW_DRPHW_1

2018年10月15日 承認

2021年08月19日 改訂(第6版)

Dr.sign

Ns.sign


Ph.sign

病棟・科名	登録番号 《SYPID》	氏名 《ORIBP_KANJI》	年齢 様《SYAGE》	身長 cm	体重 kg	体表面積 m ²
疾患名	施行予定日 月 日 ~ ()		実施サイクル コース目	【調製指示】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		
備考[標準投与量逸脱など]				放射線併用 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		

Day1(/)

《治療当日・治療前》

アプレピタントカプセル125mg 1回 1Cを
治療開始前に服用



初回 : 90分かけてdiv
↓ (忍耐力良好)
2回目 : 60分で投与可
↓ (忍耐力良好)
以降 : 30分で投与可

Day1(/) 夕 ~ Day15(/) 朝

内服薬

カペシタビン錠

★1日量 mg

※1回 錠 (mg / 回)

を1日2回、14日間服用

【カペシタビン初回基準1回量】

体表面積	初回基準量
1.31m ² 未満	900mg/回
1.31m ² ~1.64m ² 未満	1,200mg/回
1.64m ² 以上	1,500mg/回

※適宜増減

Day2(/) ~ Day3(/)

《治療翌日朝より2日間服用》

デカドロン錠 1回 4錠を
1日2回(朝昼食後) 服用

アプレピタントカプセル80mg 1回 1Cを
午前中(朝食後)に服用

CAPIRI+Bevacizumab療法

標準投与量:

Bev	7.5 mg/kg	day1
CPT-11	200 mg/m ²	day1
Capecitabine	800 mg/m ² × 2回	day1-14 3週毎