

乳癌に対する SG療法

(トロデルビ))RPHW_)RPHW_)

Dr.sign		Ns.sign		Ph.sign		
病棟・科名	登録番号	氏名	年齢	身長	体重	体表面積
	<<SYPID>>	<<ORIBP_KANJI>>	様 <<SYAGE>>	cm	kg	m ²
疾患名	施行予定日		実施サイクル	【調製指示(初日)】		
	月	日 ~ ()	コース目	□ 調製可 □ TEL連絡後調製		
備考[標準投与量逸脱など]			放射線併用	【調製指示(day8)】		
			□ 有 □ 無	□ 調製可 □ TEL連絡後調製		

Day1 (/) Day8 (/)

アプレピタントカプセル125mg 1回 1Cを
治療開始前に服用

《トロデルビ投与30分前に服用》


カロナール錠(500) 2T 過敏反応防止のため

Day2 (/) ~ Day3 (/)
Day9 (/) ~ Day10 (/)

アプレピタントカプセル80mg 1回 1Cを
午前中(朝食後)に服用

デカドロン錠 1回 8錠を
1日2回(朝昼食後) 服用

Day1 (/) Day8 (/)



※トロデルビの投与速度
初回 3 時間
2回目以降 2 時間

※副作用の程度によりDay2,3、Day9,10の
デカドロンは省略可能

Sacituzumab Govitecan療法

標準投与量:
Sacituzumab Govitecan 10 mg/kg day1,8
3週毎(2投1休)