

非小細胞肺癌に対する【80kg未満】Amivantamab+Lazertinib療法1コース目

(ライブリバント+ラズクルーズ)

<<ORIP>>
>RPHW_1

2025年07月28日 承認

Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号	氏名	年齢	身長	体重	体表面積
	<<SYPID>>	<<ORIBP_KANJI>>	様 <<SYAGE>>	cm	kg	m ²
疾患名	施行予定日	実施サイクル	【調製指示】			
	月 日 ~ ()	コース目	□ TEL連絡後調製			
備考[標準投与量逸脱など]			放射線併用			
			□ 有 □ 無			

Day1 (/)

《ライブリバント投与30分前に服用》

カロナール錠(500) 2T ライブリバントの
過敏反応防止のため

生理食塩水 500mL 本管

(5hr)

側管

生理食塩水 50mL
ポララミン5mg 1A
デキサート6.6mg 1V
デキサート1.65mg 1A
(リン酸エステル換算 10mg)

(30min)

専用ルート

※

生理食塩水 250mL
ライブリバント 350 mg

全開で

生理食塩水 50mL

終了抜去

Day2 (/)

《ライブリバント投与30分前に服用》

カロナール錠(500) 2T ライブリバントの
過敏反応防止のため

生理食塩水 500mL 本管 側管

(5hr)

生理食塩水 50mL
ポララミン5mg 1A
デキサート6.6mg 1V
デキサート1.65mg 1A
(リン酸エステル換算 10mg)

(30min)

専用ルート

※

生理食塩水 250mL
ライブリバント 700 mg

全開で

生理食塩水 50mL

終了抜去

Day8 (/)

Day15 (/)

Day22 (/)

《ライブリバント投与30分前に服用》

カロナール錠(500) 2T ライブリバントの
過敏反応防止のため

生理食塩水 500mL 本管

(3-4hr)

側管

生理食塩水 50mL
ポララミン5mg 1A

(30min)

専用ルート

※

生理食塩水 250mL
ライブリバント 1050 mg

全開で

生理食塩水 50mL

終了抜去

★内服薬

Day1 (/) ~ 継続内服

ラズクルーズ錠

★1日 mg

連日 服用

※ アピキサバン(エリキュース)2.5mg/回 1日2回
治療開始後 4ヶ月間内服 必須

ライブリバントは調製後10時間以内に投与すること

Amivantamab+Lazertinib療法

標準投与量

Amivan	350 mg/body	day1
	700 mg/body	day2
	1050 mg/body	day8,15,22
Lazertinil	80-240 mg/body	連日 4週毎

※ライブリバント投与速度

day1,2	50mL/hr	→	75mL/hr	} 投与開始から2時間後、速度UP可 (infusion reactionない場合)
day8	85mL/hr	day15,22	125mL/hr	