

B細胞性リンパ腫に対する R-FCM療法

(リツキシマブ+フルダラ+エンドキサン+ノバントロン) (RPHW_DRPHW_)

2012年02月14日 承認

2025年03月25日 改訂

Dr.sign

Ns.sign


Ph.sign

病棟・科名	登録番号	氏名	年齢	身長	体重	体表面積
	<<SYPID>>	<<ORIBP_KANJI>>	様 <<SYAGE>>	cm	kg	m ²
疾患名	施行予定日	実施サイクル	【調製指示(初日)】			
	月 日 ~ ()	コース目	□ 調製可 □ TEL連絡後調製			
備考[標準投与量逸脱など]			【調製指示(2日目以降)】			
			□ 調製可 □ TEL連絡後調製			

Day1 (/)

《リツキシマブ投与30分前に服用》

ポララミン錠	1錠	過敏反応
カロナール錠	500mg	防止の為



※リツキシマブ投与速度

最初の1時間

↓ () mg/hr

次の1時間

↓ () mg/hr


以後

↓ () mg/hr

★10倍希釈の場合はmg = mL


Day2 (/)

本管



Day3 (/) ~ Day4 (/)

本管



R-FM療法

標準投与量:

Rituximab	375 mg/m ²	day1
MIT	8 mg/m ²	day2
F-ara-A	25 mg/m ²	day2-4
CPA	200 mg/m ²	day2-4