乳癌に対する wPTX+wHCPT療法

(パクリタキセル+トラスツズマブ)

)RPHW DRPHW \

過敏症状

の発現が

無ければ

3.3mg**^**

mg

50_mL

2008年06月10日 承認 2019年09月25日 改訂(第11版)				Dr.si	Dr.sign		/		Ns.sign		Ph.sign		
病棟•科名	登録番号		氏名				年齢	身長		体重		体表面積	
	< <sypi< td=""><td>)>></td><td><<0R</td><td>IBP_KA</td><td><<iua< td=""><td>様</td><td><<syage< td=""><td>≣>></td><td>cn</td><td>n</td><td>kg</td><td></td><td>m^2</td></syage<></td></iua<></td></sypi<>)>>	<<0R	IBP_KA	< <iua< td=""><td>様</td><td><<syage< td=""><td>≣>></td><td>cn</td><td>n</td><td>kg</td><td></td><td>m^2</td></syage<></td></iua<>	様	< <syage< td=""><td>≣>></td><td>cn</td><td>n</td><td>kg</td><td></td><td>m^2</td></syage<>	≣>>	cn	n	kg		m^2
疾患名		施行予定日						実施サイクル		【調製指示(初日)】			
		F	1	日~()コース	目	コース・	予定 □	調製可	те	L連絡後調	製
アルコール過敏症		備考[標準投与量逸脱など]								【調製指示(2回目以降)】			
□なし□あり(慎重投与)										調製可	ТЕ	L連絡後調	製

放射線併用

□有 □ 無

初回Day1(/

本管

生理食塩水 100mL **側管**

 全開で
 生理食塩水 50mL


 生理食塩水 250mL
 トラスツズマブ mg


 生理食塩水 50mL
 トラスツズマブ 50mL

 全開で
 生理食塩水 50mL

初回Day2(/)

本管





トラスツズマブ

生理食塩水

以後、Day1 · Day8 · Day15

本管

生理食塩水 100mL

Day22

本管

(1.5hr)

全開で



投与スケジュール

			1⊐	<u>ース</u>		2コース					
day	1	2		8	15	22	29	36	43	50	
weeklyPTX (3投1休)	休	Ţ		1	Ţ	×	ļ	\downarrow	\downarrow	休	
HCPT (連投)	1	休		\downarrow	ļ	1	ļ	1	1	ļ	

weeklyPTX+HCPT療法

標準投与量:

PTX 80 mg/m² day1,8,15 HCPT 2 mg/<u>kg</u> day1,8,15,22 (初回のみ4mg/kg) 4週毎