

悪性リンパ腫に対するGCD-(R)療法

(カルボプラチン+ゲムシタビン+デキサート+(リツキシマブ)) RPHW_DRPHW_1

2015年09月15日 改訂(第4版)


Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号 <<SYPID>>	氏名 <<ORIBP_KANJI>>	年齢 様 <<SYAGE>>	身長 cm	体重 kg	体表面積 m ²
疾患名	施行予定日 月 日 ~ ()		実施サイクル コース目	【調製指示(初日)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		
備考[標準投与量逸脱など]			放射線併用 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	【調製指示(Day2-4,8)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		


Day1 (/)



Day8 (/)

《リツキシマブ投与30分前に服用》

ポララミン錠 1錠 (過敏反応防止の為)
カロナール錠 500mg



Day2 (/) ~ Day4 (/)



GCD-(R)療法

標準投与量:

CBDCA	AUC=5	day1	R	375 mg/m ²	day8
GEM	1,000 mg/m ²	day1,8	DEX	40 mg/day	day1-4,8

3週毎