

多発性骨髄腫に対する KRD療法(13コース目以降)

(カiproリス+レブラミド+デキサメタゾン)

DRPHW_DRPHW_1

2016年10月17日 作成

Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign

| | | | | | | |
|---------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--|----------|------------------------|
| 病棟・科名 | 登録番号 <<SYPID>> | 氏名 <<ORIBP_KANJI>> | 年齢 様 <<SYAGE>> | 身長 cm | 体重 kg | 体表面積 m ² |
| 疾患名 | 施行予定日 月 日 ~ () | | 実施サイクル コース目 | 【調製指示(初日~2日目)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製 | | |
| 備考[標準投与量逸脱など] | | | | 【調製指示(8日目以降)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製 | | |

内服薬

レブラミドカプセル

★1日 mg



21日間 服用

Day1(/ /)


Day2(/ /)

Day15(/ /)

Day16(/ /)



Day8(/ /) Day22(/ /)



KRD療法(2-12コース目)

標準投与量:

Carfilzomib 27 mg/m² day 1.2.15.16

Dexa 40 mg/body day 1.8.15.22

Lenalido 25 mg/body day1-21

4週毎