

悪性リンパ腫(非ホジキン)に対する VR-CAP療法

(ベルケイド+リツキシマブ+エンドキサン+ドキシソルピシン+プレドニン) (RPHW_DRPHW)

2016年11月21日 作成

Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign


病棟・科名	登録番号 《《SYPID》》	氏名 《《ORIBP_KANJI》》	年齢 様 《《SYAGE》》	身長 cm	体重 kg	体表面積 m ²
疾患名	施行予定日 月 日 ~ ()	コース目	実施サイクル コース予定	【調製指示(初日)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		
備考[標準投与量逸脱など]				【調製指示(2日目)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		

Day1 (/)

《リツキシマブ投与30分前に服用》

ポララミン錠 1錠 (過敏反応防止の為)
カロナール細粒 1g

本管




※リツキシマブ投与速度

最初の1時間
↓ () mg/hr
次の1時間
↓ () mg/hr
以後
↓ () mg/hr

★10倍希釈の場合はmg = mL

Day2 (/)

本管




内服薬

プレドニン錠

★1日 mg
5日間 服用

(/) (/) (/)

本管



VR-CAP療法

標準投与量:

R 375 mg/m² day1
CPA 750 mg/m² day2
ADM 50 mg/m² day2
Bortezomib 1.3 mg/m² day2
PSL 100 mg/body day2-6

3週毎