

多発性骨髄腫に対する DBd療法(1サイクル目)

(ダラザレックス+ベルケイド+デキサメタゾン)

DRPHW_DRPHW\

2017年12月18日 承認
2017年12月7日 作成

Dr.sign

Ns.sign


Ph.sign

病棟・科名	登録番号	氏名	年齢	身長	体重	体表面積
	<<SYPID>>	<<ORIBP_KANJI>>	様 <<SYAGE>>	cm	kg	m ²
疾患名	施行予定日		実施サイクル		【調製指示(初日~2日目)】	
	月	日 ~ ()	コース目	コース予定	<input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製	
備考[標準投与量逸脱など]					【調製指示(4日目以降)】	
					<input type="checkbox"/> 調製可 <input checked="" type="checkbox"/> TEL連絡後調製	

Day1(/ /) Day8(/ /)
Day15(/ /)

《ダラザレックス投与1時間前に服用》

カロナール錠(500) 2T
モンテルカスト錠(10) 1T
過敏反応防止のため




皮下注
ベルケイド mg

※ 注射部位反応に注意
※ / はベルケイド皮下注は
ありません!!

Day4(/ /) Day11(/ /)

皮下注
ベルケイド mg
※ 注射部位反応に注意



内服治療の場合
レナデックス
★1日 mg
服用

Day2(/ /) Day5(/ /)
Day9(/ /) Day12(/ /)

上記デキサメタゾンと同治療

※ダラザレックスの投与速度

0~1時間	↓ () mL/hr
1~2時間	↓ () mL/hr
2~3時間	↓ () mL/hr
3時間以降	↓ () mL/hr

DBd療法(1サイクル目)

標準投与量:

Daratumumab	16 mg/kg	day 1,8,15
Dexa	20 mg/body	day 1,2,4,5,8,9,11,12
Bortezomib	1.3 mg/m ²	day 1,4,8,11

3週毎