

多発性骨髄腫に対する DBd療法(2-3サイクル目)

(ダラザレックス+ベルケイド+デキサメタゾン)

DRPHW_DRPHW\

2017年12月18日 承認
2017年12月7日 作成

Dr.sign

Ns.sign


Ph.sign

病棟・科名	登録番号 《《SYPID》》	氏名 《《ORIBP_KANJI》》	年齢 様《《SYAGE》》	身長 cm	体重 kg	体表面積 m ²
疾患名	施行予定日 月 日 ~ ()	コース目	実施サイクル コース予定	【調製指示(初日~2日目)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		
備考[標準投与量逸脱など]				【調製指示(4日目以降)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		

Day1(/ /) Day8(/ /)
Day15(/ /)

《ダラザレックス投与1時間前に服用》

カロナール錠(500) 2T
モンテルカスト錠(10) 1T
過敏反応防止のため



皮下注
ベルケイド mg

※ 注射部位反応に注意
※ / はベルケイド皮下注は
ありません!!

※ダラザレックスの投与速度

0~1時間	↓ () mL/hr
1~2時間	↓ () mL/hr
2~3時間	↓ () mL/hr
3時間以降	↓ () mL/hr


Day4(/ /) Day11(/ /)

皮下注

ベルケイド mg

※ 注射部位反応に注意

点滴治療の場合



内服治療の場合

レナデックス
★1日 mg
服用

Day2(/ /) Day5(/ /)
Day9(/ /) Day12(/ /)

上記デキサメタゾンと同治療

DBd療法(2-3サイクル目)

標準投与量:		
Daratumumab	16 mg/kg	day 1,8,15
Dexa	20 mg/body	day 1,2,4,5,8,9,11,12
Bortezomib	1.3 mg/m ²	day 1,4,8,11
3週毎		