

多発性骨髄腫に対する DBd療法(4-8サイクル目)

(ダラザレックス+ベルケイド+デキサメタゾン)

DRPHW_DRPHW\

2017年12月18日 承認
2017年12月7日 作成

Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号 《《SYPID》》	氏名 《《ORIBP_KANJI》》	年齢 様《《SYAGE》》	身長 cm	体重 kg	体表面積 m ²
疾患名	施行予定日 月 日 ~ ()		実施サイクル コース目	【調製指示(初日~2日目)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		
備考[標準投与量逸脱など]				【調製指示(4日目以降)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		

Day1 (/ /)

《ダラザレックス投与1時間前に服用》

カロナル錠(500) 2T
モンテルカスト錠(10) 1T 過敏反応防止のため


皮下注

ベルケイド mg

※ 注射部位反応に注意

本管

側管



※ダラザレックスの投与速度

0~1時間	↓ () mL/hr
1~2時間	↓ () mL/hr
2~3時間	↓ () mL/hr
3時間以降	↓ () mL/hr

Day4 (/ /) Day8 (/ /)

Day11 (/ /)

皮下注


ベルケイド mg

※ 注射部位反応に注意

点滴治療の場合

本管

側管



内服治療の場合

レナデックス

★1日 mg

服用

Day2 (/ /) Day5 (/ /)

Day9 (/ /) Day12 (/ /)

上記デキサメタゾンと同治療

DBd療法(4-8サイクル目)

標準投与量:

Daratumumab	16 mg/kg	day 1
Dexa	20 mg/body	day 1,2,4,5,8,9,11,12
Bortezomib	1.3 mg/m ²	day 1,4,8,11
3週毎		