

# 大腸癌に対する FOLFIRI+RAM療法

(レボホリナート+イリノテカン+フルオロウラシル+サイラムザ) RPHW\_DRPHW\_1

2018年03月19日 承認  
2020年04月16日 改訂(第2版)

Dr.sign

Ns.sign


Ph.sign

病棟・科名	登録番号 《《SYPID》》	氏名 《《ORIBP_KANJI》》	年齢 様《《SYAGE》》	身長 cm	体重 kg	体表面積 m <sup>2</sup>
疾患名	施行予定日 月 日 ~ ( )		実施サイクル コース目	【調製指示】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		
備考[標準投与量逸脱など]				放射線併用 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		

Day1 ( / )

## 《治療当日・治療前》


アプレピタントカプセル125mg 1回 1Cを  
治療開始前に服用



Day2 ( / ) ~ Day3 ( / )

デカドロン錠 1回 4錠を  
1日2回(朝昼食後) 服用

アプレピタントカプセル80mg 1回 1Cを  
午前中(朝食後)に服用



## FOLFIRI+RAM療法

### 標準投与量:

RAM	8 mg/kg	day1
I-LV	200 mg/m <sup>2</sup>	day1
CPT-11	150 mg/m <sup>2</sup>	day1
5-FU	400 mg/m <sup>2</sup>	(bolus)
5-FU	2,400 mg/m <sup>2</sup>	(46hr持続)

2週毎