

悪性リンパ腫に対する造血幹細胞移植の前処置 LEED療法

(アルケラン+エンドキサン+エトポシド+デキサート) (RPHW_DRPHW)

2014年04月01日 改訂(第6版)

Dr.sign

Ns.sign


Ph.sign

病棟・科名	登録番号 《《SYPID》》	氏名 《《ORIBP_KANJI》》	年齢 様《《SYAGE》》	身長 cm	体重 kg	体表面積 m ²
疾患名	施行予定日 月 日 ~ ()		実施サイクル コース目	【調製指示(初日~Day3)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		
備考[標準投与量逸脱など]		体表面積が大きい場合は、薬剤過多にならないよう標準体重で投与量を検討。 標準体重(kg)=身長(m) ² ×22			【調製指示(Day4)】 <input type="checkbox"/> 連投可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製	



Day1(/ /) ~ Day2(/ /)

Day4(/ /)

Day4はTEL後に調製します。



Day3(/ /)



PBSCT(末梢造血幹細胞移植)

LEED療法
標準投与量:

CPA	60 mg/kg	day1,2
Mesna	CPA1日量の40%相当量 × 3回	day1,2
VP-16	300 mg/m ²	day1-3
Dexa	40 mg/body	day1-4
L-PAM	130 mg/m ²	day4